

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مرکز آموزشی درمانی فارابی

داروی زیتاکس

واحد آموزش به بیمار

۳۸۵۵۷۲۸۳

آمپول زیتاکس

آمپول زیتاکس، همان ریتوکسی ماب است و یکی از داروهایی می باشد که در درمان ام اس به کار می رود. عملکرد آن مقابله با سلول های ایمنی لنفوسیت B و ضد CD۲۰ می باشد. این دارو برای بیماری هایی که در آن سلول های ایمنی بدن نا منظم میشوند استفاده می شود.

شکل دارویی :

شکل دارویی به صورت تزریقی است. آمپول زیتاکس به صورت ویال های ۱۰ و ۵۰ میلی گرمی در محلول هایی غلیظ شده بی رنگ و شفاف گونه است. که در دو دوز ۱۰۰ و ۵۰۰ میلی گرمی ارائه می شود.

زمان مصرف زیتاکس :

زیتاکس تنها با ارائه نسخه پزشک قابل تهیه می باشد و دوز مصرفی آن برای گروه های سنی مختلف بسته به نوع بیماری آنها متفاوت است و در بیمارستان تزریق خواهد شد. در مدت زمان انفوزیون شما به طور مستقیم توسط یک پزشک یا پرستار تحت نظر خواهید بود. مصرف دارو نباید بدون مشورت با پزشک قطع گردد. جهت درمان مؤثر، همیشه دوره درمان توصیه شده پزشک خود را تکمیل نمایید و از مصرف هر گونه داروی سرخود در زمان مصرف این دارو پرهیز نمایید.

نکات مهم هنگام مصرف زیتاکس

۱- اگر بعد از استفاده از این دارو دچار علائم و نشانه های جدیدی مثل از دست دادن بینایی، ناتوانی در هماهنگ کردن حرکات بدن، تحلیل حافظه یا اختلال در گفتار شدید بلا فاصله به پزشک خود اطلاع دهید.

۲- اگر در هنگام یا بعد از مصرف زیتاکس دچار علائمی مانند تنگی نفس شدید، التهاب و تورم پوستی، افت فشار خون، تب و لرز و کهمیر شدید به سرعت به پزشک خود اطلاع دهید. اکثر این علائم در فاصله ۳۰ تا ۱۲۰ دقیقه بعد از تزریق روی می دهد و تا رفع کامل این علائم باید تحت نظر پزشک باشید.

۳- در صورت داشتن سابقه بیماری قلبی نظیر نارسایی قلبی، تپش قلب و تعداد پایین نوتروفیل یا پلاکت در آزمایش خون،

سابقه بیماری هپاتیت ب و تزریق واکسن به پزشک خود اطلاع دهید.

عوارض آمپول زیتاکس:

عوارض بسیار شایع:

- عفونت ویروسی یا باکتریایی، التهاب برونش های ریه
- کاهش میزان گلبول های سفید یا پلاکت ها به همراه تب یا بدون آن
- خارش یا ریزش مو
- تب، سر درد، کمبود انرژی وضعف
- عوارض شایع :
- مشکلات ماهیچه ایی مانند سفتی عضلات، درد ماهیچه ای ، گردن و کمر درد
- صدای زنگ در گوش
- آشفته گی، سرگیجه، اضطراب و احساسات غیر طبیعی در پوست
- مانند سوزن سوزن شدن و بی حسی
- افزایش ترشح اشک و التهاب چشم
- تهوع ، اسهال، یبوست، سستی و ناراحتی در بلع غذا، سوء هاضمه